TEST DI SENSIBILITÀ AI CHEMIOANTIBIOTICI (MICRODILUIZIONE IN BRODO)

Panel Enterococcus faecium/faecalis-animali da compagnia

ANTIBIOTICO*	**Raccomandazioni§**
Benzilpenicillina (HD)	NR
Tetraciclina (HD, Ur)	NR
Doxiciclina (HD)	non utilizzare in terapia come prima scelta
Cloramfenicolo (HD) Cane (VET)	NR
Streptomicina HLAR (VET)	Non somministrare per via orale per il trattamento di forme di malattia extraintestinale
Gentamicina HLAR (VET)	Non somministrare per via orale per il trattamento di forme di malattia extraintestinale

*in questo panel è riportato un elenco di molecole che coprono in modo ragionato le varie classi e subclassi di antibiotici, che sono rappresentative per le molecole registrate per uso veterinario utilizzabili per la determinazione delle MIC in specifici agenti batterici patogeni (o gruppi di agenti batterici patogeni). Per tali molecole sono disponibili CBs CLSI-VET, relativi alla specie animale/sede di infezione considerate. Qualora assenti, viene specificato l'utilizzo di CBs CLSI human-derived (HD) o di CASFM-VET 2023. In ultima istanza, qualora risultassero assenti CBs dei suddetti standard, sono stati utilizzati provvisoriamente epidemiological cut-off values (ECOFFs) o ECOFFs provvisori (tentative ECOFFs) EUCAST, secondo il criterio di priorità ("cascata") riportato nella Procedura Operativa Standard accreditata POS BAT 006 NOR.

Ur= infezioni delle vie urinarie inferiori
HLAR= High Level Aminoglycoside Resistance

§La colonna RACCOMANDAZIONI può essere d'ausilio per la gestione dell'esito già categorizzato (in Sensibile, Intermedio, Resistente) da parte del veterinario clinico per la scelta del chemioantibiotico da utilizzare, conformemente ai principi dell'uso prudente contenuti nei documenti Europei ed Internazionali e nelle Linee Guida per le diverse specie e produzioni animali. NR= Nessuna raccomandazione: il risultato del test per l'associazione agente patogeno-molecola considerato non prevede raccomandazioni particolari.

N.B. Considerato l'elevato numero di resistenze intrinseche di questo patogeno, è possibile testare soltanto un limitato numero di molecole (https://crab.izslt.it/linee-guida-e-strumenti/resistenze-intrinseche-in-batteri-di-interesse-veterinario.html)