TEST DI SENSIBILITÀ AI CHEMIOANTIBIOTICI (MICRODILUIZIONE IN BRODO)

Panel Agenti patogeni Gram- malattie respiratorie ovini, caprini e altri ruminanti (Pasteurellaceae)

ANTIBIOTICO	**Raccomandazioni**
Enrofloxacin (CASFM VET 2023)	non utilizzare in terapia come prima scelta
****Ceftiofur (**CASFM VET 2023)	le specie di Pasteurellaceae patogeni principali sono generalmente sensibili alla benzilpenicillina e quindi sono trattabili con penicilline naturali o aminopenicilline. Isolati con dubbia o ridotta suscettibilità alla benzilpenicillina vanno inviati al CRN-AR. E' quindi non comune osservare resistenza fenotipica alle penicilline e dover ricorrere all'uso di molecole di terza scelta, come cefalosporine di III o IV gen (es. ceftiofur)
Chloramphenicol (CASFM VET 2023)	molecola prototipo per amfenicoli non fluorurati, come ad es. Tiamfenicolo
Florfenicolo (CASFM VET 2023)	considerare come opzione terapeutica se isolato resistente al cloramfenicolo
Sulfametoxazolo/ Trimetoprim (CASFM VET 2023)	NR
Tetraciclina (CASFM VET 2023)	NR
Kanamicina (CASFM VET 2023)	Non somministrare per uso orale per il trattamento di forme di malattia extraintestinale
Penicillina (ECOFFs- EUCAST)	NR
Acido nalidixico (CASFM VET 2023) *Pasteurellaceae*	NR

*in questo panel è riportato un elenco di molecole che coprono in modo ragionato le varie classi e subclassi di antibiotici, che sono rappresentative per le molecole registrate per uso veterinario utilizzabili per la determinazione delle MIC in specifici agenti batterici patogeni (o gruppi di agenti batterici patogeni). Per tali molecole sono disponibili CBs CLSI-VET, relativi alla specie animale/sede di infezione considerate Qualora assenti, viene specificato l'utilizzo di CBs CLSI human-derived (HD) o di CASFM-VET 2023. In ultima istanza, qualora risultassero assenti CBs dei suddetti standard, sono stati utilizzati provvisoriamente epidemiological cut-off values (ECOFFs) o ECOFFs provvisori (tentative ECOFFs) EUCAST, secondo il criterio di priorità ("cascata") riportato nella Procedura Operativa Standard accreditata POS BAT 006 NOR.

**Ceftiofur: gli isolati sospetti resistenti devono essere inviati al CRN-AR

§La colonna RACCOMANDAZIONI può essere d'ausilio per la gestione dell'esito già categorizzato (in Sensibile, Intermedio, Resistente) da parte del veterinario clinico per la scelta del chemioantibiotico da utilizzare, conformemente ai principi dell'uso prudente contenuti nei documenti Europei ed Internazionali e nelle Linee Guida per le diverse specie e produzioni animali. NR= Nessuna raccomandazione: il risultato del test per l'associazione agente patogeno-molecola considerato non prevede raccomandazioni particolari.