TEST DI SENSIBILITÀ AI CHEMIOANTIBIOTICI (MICRODILUIZIONE IN BRODO)

Panel Corynebacterium spp

ANTIBIOTICO*	**Raccomandazioni§**
Penicillina (VET)	NR
Eritromicina (VET)	non utilizzare in terapia come prima scelta
Tetraciclina (VET)	NR
Doxiciclina (VET)	NR
Sulfametoxazolo/ Trimetoprim (VET)	NR
Clindamicina (VET)	NR

Panel Erysipelothrix rhusiopathiae

ANTIBIOTICO*	**Raccomandazioni§**
Penicillina (VET)	NR
Eritromicina (VET)	non utilizzare in terapia come prima scelta
Ceftiofur (VET)	non utilizzare in terapia come prima scelta le cefalosporine di III-IV gen. registrate per gli animali
Clindamicina (VET)	NR

*in questo panel è riportato un elenco di molecole che coprono in modo ragionato le varie classi e subclassi di antibiotici, che sono rappresentative per le molecole registrate per uso veterinario utilizzabili per la determinazione delle MIC in specifici agenti batterici patogeni (o gruppi di agenti batterici patogeni). Per tali molecole sono disponibili CBs CLSI-VET, relativi alla specie animale/sede di infezione considerate. Qualora assenti, viene specificato l'utilizzo di CBs CLSI human-derived (HD) o di CASFM-VET 2023. In ultima istanza, qualora risultassero assenti CBs dei suddetti standard, sono stati utilizzati provvisoriamente epidemiological cut-off values (ECOFFs) o ECOFFs provvisori (tentative ECOFFs) EUCAST, secondo il criterio di priorità ("cascata") riportato nella Procedura Operativa Standard accreditata POS BAT 006 NOR.

§La colonna RACCOMANDAZIONI può essere d'ausilio per la gestione dell'esito già categorizzato (in Sensibile, Intermedio, Resistente) da parte del veterinario clinico per la scelta del chemioantibiotico da utilizzare, conformemente ai principi dell'uso prudente contenuti nei documenti Europei ed Internazionali e nelle Linee Guida per le diverse specie e produzioni animali. NR= Nessuna raccomandazione: il risultato del test per l'associazione agente patogeno-molecola considerato non prevede raccomandazioni particolari.